


Aspecto dorsal en vuelo

Pardela Balear *Puffinus mauretanicus* Lowe, 1921



Aspecto dorsal en vuelo
Pardela Mediterránea *Puffinus yekouan* (Acerbi, 1827)


dorso más oscuro que el de la pardela Balear

cabeza redondeada y compacta

región occipital abultada

región frontal con escalón marcado

pico corto y estilizado



El vuelo de las pardelas es muy característico. El extremo de una de las alas parece que corta la superficie del mar y con mucha observación, veremos que llegan a rozar el agua. Vuelan muy cerca del agua y rara vez se alzan a más de 5 metros de altura. Las alas se mantienen en una posición extendida y rígida. Las aves vuelan en zigzag quebrando las crestas de las olas y mostrándose alternativamente su superficie ventral y dorsal.

plumaje recién mudado

dorso de color pardo negruzco

los pies sobresalen por detrás de la cola



mancha blanca, más o menos difusa, con forma de luna cresciente en la región auricular (ausente en algunos individuos)

plumaje gastado
dorso de color pardo claro

el blanco de los flancos se extiende dorsalmente en las aves más claras

Las pardelas nadan debajo del agua impulsándose con las alas parcialmente plegadas en forma de M.

Vuelo muy parecido a la pardela Balear.


Aspecto ventral en vuelo

Pardela Balear *Puffinus mauretanicus* Lowe, 1921

La región ventral es muy variable en la Pardela Balear. Para simplificar mostramos únicamente tres formas.



No hay delimitación nítida entre el dorso y vientre.
La mayoría de las pardelas tienen una coloración intermedia.



Aspecto ventral en vuelo
Pardela Mediterránea *Puffinus yekouan* (Acerbi, 1827)
Delimitación nítida entre el dorso y vientre.

plumaje ventral oscuro

Las poblaciones de pardela Balear de la isla de Menorca presentan rasgos biométricos y morfológicos de la Pardela Mediterránea. Los individuos menorquines presentan plumajes del tipo pardela Balear claro o pardela Mediterránea oscura.

las formas más oscuras son difíciles de separar de las formas claras de Pardela Balear



La gran variabilidad de plumajes de las pardela Balear y Mediterránea, dificulta la identificación de individuos aislados. Es mucho más fácil identificar grupos de aves que presentan rasgos más o menos homogéneos. La identificación certera se consigue muchas veces mediante la comparación directa con ejemplares de la otra especie.

el blanco de la región ventral es muy puro

plumaje ventral blanco

Las poblaciones del Mediterráneo oriental presentan un mayor contraste entre el dorso oscuro y las partes ventrales de un blanco puro.

región axilar blanca con moteado oscuro
flanco blanco con moteado pardo
cobertoras infracaudales blancas con borde oscuros

contraste muy nítido entre la región dorsal y ventral

ala blanca con un ligero moteado pardo

panel blanco en la región axilar anterior

partes inferiores de color blanco

