



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Direcció General de Salut Pública i Consum

PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2011

Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia del Sida



PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

En el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación empezó a impulsar la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en carpas instaladas en la calle, y desde el 2008 se realizan en las sedes de ALAS (Asociación de Lucha Anti-Sida de Baleares) de Palma e Ibiza, en diferentes CAD (Centros de Atención a la Drogodependencia) y en la sede de Médicos del Mundo y en el CAITS (Centro de Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual).

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población de forma personalizada sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de counselling. El test utilizado es el Determine HIV 1/2, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública realizándose un seguimiento. Asimismo se ofrece apoyo psicosocial.

Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del 2011

Durante el 2011 se han realizado **un total de 889** pruebas rápidas en los distintos centros:



Centro	Pruebas	Positivos	Confirmados
ALAS Mallorca	282	3	
ALAS Ibiza	207	0	
Médicos del Mundo	198	0	
CAD	98	0	
CAITS	104	2	2
Total	889	5	

En 846 de las 889 pruebas realizadas se dispone de información sobre las características sociodemográficas y las conductas de riesgo con respecto al VIH con los siguientes resultados:

Sexo y edad

El 48,5 % de las personas que se realizaron la prueba eran hombres y el 51,1 %, mujeres. El grupo de edad mayoritaria se sitúa en el rango de 30-39 años (36,5 %) seguido del grupo de 25-29 años (22,3 %). (Ver fig.1, fig.2 y tabla 1)

Fig. 1 CAIB. Distribución por sexo





Fig. 2 CAIB. Distribución edad




Tabla 1. Distribución por sexo y edad

Edad	Hombres		Mujeres		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menor de 25	77	18,8	93	21,3	170	20,09
25-29	70	17,1	119	27,3	189	22,3
30-39	162	39,5	147	33,7	309	36,5
40 o más	93	22,7	73	16,7	166	19,6
NC	8	2,0	4	0,9	12	1,4
TOTAL	410	100	436	100	846	100

País de origen

El 54,1 % de las personas que solicitaron hacerse la prueba eran de origen español y el 44,4 %, de origen extranjero. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto. (Fig. 3, fig. 4).

Fig. 3 CAIB. País de origen






Fig. 4 Distribución por zonas geográficas



Las mujeres procedentes de otros países solicitaron hacerse la prueba en mayor porcentaje que las españolas (74,5 % vs. 33 %, fig. 5). De las mujeres que se hicieron la prueba (436), el 56,4 % ejercían la prostitución. El 6,2% de las españolas que solicitaron la prueba ejercían la prostitución frente al 50,2% de las extranjeras, lo que podría explicar en parte la diferencia de porcentajes.




Fig. 5 Porcentaje de personas que solicitan la prueba según sexo y procedencia



Tendencia sexual

El 74,5 % de las personas se definen como heterosexuales, el 17,6 %, como homosexuales, y el 6,3 %, como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual según el sexo queda representada en la fig. 6.

Fig. 6 Distribución sexo y tendencia sexual



HTX: Heterosexual HMX: Homosexual BSX: Bisexual NC: No contesta




Motivo de la prueba

En el 96 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 93,6 % de los casos la causa era una práctica sexual de riesgo.

Más de la mitad de las personas (68,6 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Los que repiten la prueba con más frecuencia (80,5 %) son los hombres que practican sexo con hombres (HSH) (Fig. 7).

Fig. 7 Porcentaje de personas que repiten la prueba según su sexo




Uso del preservativo

Un total de 792 personas han contestado a las preguntas sobre el uso de preservativo. De éstas, sólo la mitad (65,2 %) utilizan siempre preservativo en sus relaciones sexuales con parejas ocasionales, y el 7,8 % no utilizan nunca o casi nunca. Los hombres que usan siempre preservativo con su pareja ocasional son menos que las mujeres (54,5 % vs. 75,2 %). Entre los hombres, los homosexuales utilizan el preservativo en mayor proporción que los heterosexuales (65,2 % vs. 46,2 %) (fig. 8).



Fig. 8 Uso de preservativo con la pareja ocasional



Entre las personas que tienen pareja estable (443), los hombres heterosexuales son los que menos usan preservativo en las relaciones ocasionales (51,9 % vs. 78,1 % de los homosexuales y el 82,7 % de las mujeres) y el 16 % de hombres heterosexuales no utilizan nunca o casi nunca (4,1 % de los homosexuales y el 4 % de las mujeres).