# BOTULISME

## Definició de cas

| | |
|---|---|
| **Criteri clínic** | Persona que presenta, almenys, un dels següents:<br>– Afectació bilateral de nervis cranials (amb diplopia, visió borrosa, disfàgia o disfunció bulbar)<br>– Paràlisi simètrica perifèrica<br><br>En lactants, almenys un dels següents:<br>– Restrenyiment<br>– Letargia<br>– Inapetència<br>– Ptosis palpebral<br>– Disfàgia<br>– Debilitat muscular generalitzada |
| **Criteri de laboratori** | Al menys, un dels tres següents:<br>– Detecció de toxina botulínica en una mostra clínica (sèrum, femta o aspirat gàstric)<br>– Aïllament de *Clostridium* productor de toxina botulínica en femta o aspirat gàstric (botulisme intestinal) o en la ferida (botulisme per ferida)<br>– Detecció de gens que codifiquen la toxina botulínica en l'aïllat o en la mostra clínica |
| **Criteri epidemiològic** | Almenys una de las següents relacions epidemiològiques:<br>- Exposició a una font comú<br>- Exposició a aliments o aigua de beguda contaminats<br>- Exposició a toxina botulínica per injecció terapèutica o estètica |

## Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: persona que presenta el **criteri clínic** i s'ha sol·licitat prova microbiològica de botulisme. Si el diagnòstic clínic més probable és botulisme, encara que el resultat sigui negatiu, es considerarà cas sospitós.
- **Cas probable**: persona que presenta el criteri **clínic** i el criteri **epidemiològic**.
- **Cas confirmat**: persona que presenta el criteri de **laboratori**.

## Definició de brot

Aparició de 2 o més casos de botulisme amb una relació epidemiològica.

Font: Protocolo de vigilancia de botulismo. Sistema de Vigilancia de la Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública