FEBRE TIFOIDE I PARATIFOIDE

Definició de cas

Criteri clínic	Persona que presenta: – Febre perllongada O – Almenys dues de les següents: • Cefalea • Bradicàrdia relativa • Tos seca • Diarrea, restrenyiment, malestar general o dolor abdominal
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents: – Aïllament de Salmonella Typhi o Paratyphi A, B o C en una mostra clínica – Detecció d'àcid nucleic de Salmonella Typhi o Paratyphi A, B* o C en una mostra clínica *En cas d'identificar-se Salmonella Paratyphi B, cal fer una prova de fermentació de d-tartrat per diferenciar entre el biotip fermentador de tartrat (causant de quadres gastrointestinals) i el no fermentador (productor de febre paratifoide)
Criteri epidemiològic	Almenys una de les relacions epidemiològiques següents: – Transmissió de persona a persona – Exposició a una font comuna – Exposició a aliments o aigua contaminats – Exposició mediambiental

Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: no procedeix.
- **Cas probable**: persona que presenta el **criteri clínic** i **l'epidemiològic**.
- **Cas confirmat**: persona que presenta el **criteri de laboratori**.

Definició de brot

L'aparició de 2 o més casos amb relació epidemiològica.

Font: Protocolo de vigilancia de fiebre tifoidea y paratifoidea. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública