HEPATITIS A

Definició de cas

Criteri clínic	Persona amb fatiga, dolor abdominal, inapetència, nàusees, vòmits intermitents I, almenys, una de les següents: – Febre – Icterícia – Nivells elevats de transaminases sèriques
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents: – Detecció de l'àcid nucleic del virus de l'hepatitis A en sèrum o femta – Resposta d'anticossos específics (IgM) del virus de l'hepatitis A* – Detecció de l'antigen del virus de l'hepatitis A en femta * En cas de positivitat únicament d'IgM, aquesta detecció ha d'anar unida a un augment de les transaminases
Criteri epidemiològic	Almenys una de les relacions epidemiològiques següents: – Transmissió de persona a persona – Exposició a una font comuna – Exposició a aliments o aigua contaminats – Exposició mediambiental

Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: no procedeix.
- **Cas probable**: persona que presenta el **criteri clínic** i **l'epidemiològic**.
- **Cas confirmat**: persona que presenta el **criteri de laboratori**.

Definició de brot

L'aparició de 2 o més casos amb relació epidemiològica.

Font: Protocolo de vigilancia de hepatitis A. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública