MALALTIA PNEUMOCÒCCICA INVASIVA

Definició de cas

Criteri clínic	Malaltia invasiva per disseminació hematògena (a través de la sang) de *S. pneumoniae*. La forma clínica de presentació de la malaltia no és determinant en la definició de cas
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents: – Aïllament* de *S. pneumoniae* en una ubicació normalment estèril (sang, líquid cefaloraquidi, líquid pleural, líquid peritoneal, líquid pericàrdic, líquid sinovial). No es considera mostra estèril l'orina – Detecció d'àcid nucleic de *S. pneumoniae* en una ubicació normalment estèril – Detecció d'antigen de *S. pneumoniae* en una ubicació normalment estèril (preferiblement mostres de líquid cefaloraquidi) *És necessari realitzar el serotipat dels aïllaments
Criteri epidemiològic	No procedeix

Classificació dels casos

Cas sospitós: no procedeix.

Cas probable: no procedeix.

Cas confirmat: persona que presenta **criteri de laboratori**.

Definició de brot

Dos o més casos confirmats de malaltia invasiva causats pel **mateix serotip** (mateix llinatge) de pneumococ (o encara no determinats) a l'àmbit familiar o altres àmbits de convivència tancats o en institucions i quan l'inici de símptomes dels casos té lloc en un període de temps de **14 dies**.

Font: Protocolo de vigilancia de enfermedad neumocócica invasiva. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública