PAROTIDITIS

Definició de cas

Criteri clínic	Febre i, almenys, una d'aquestes manifestacions: – Aparició sobtada de tumefacció, dolorosa al tacte, de les paròtides o altres glàndules salivals – Orquitis
Criteri de laboratori	Almenys, un dels següents: – Aïllament del virus de la parotiditis en mostra clínica (saliva, orina o LCR) – Detecció d'àcid nucleic del virus de la parotiditis per PCR en mostra clínica (saliva, orina o LCR) – Resposta d'anticossos específics del virus de la parotiditis al sèrum (detecció d'IgM o seroconversió d'IgG)
Criteri epidemiològic	Contacte amb un cas de parotiditis confirmat per laboratori, entre 12 i 25 dies abans de l'inici dels símptomes

Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: persona que presenta **criteri clínic**.
- **Cas probable**: persona que presenta **criteri clínic** i **criteri epidemiològic**.
- **Cas confirmat**: persona que presenta **criteri clínic** i **criteri de laboratori**.

Definició de brot

Aparició de dos o més casos confirmats o probables relacionats. A efectes de recerca i notificació, només es consideraran els brots que tinguin rellevància epidemiològica pel **grup de població** al qual pertanyen els casos, per la **gravetat** de la malaltia o pel **lloc** on ocorren (centres penitenciaris, establiments militars, hospitals, centres escolars, centres de formació, universitats).

Font: Protocolo de vigilancia de parotiditis. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública