RUBÈOLA

Definició de cas

Criteri clínic	Aparició sobtada d'exantema maculopapulós generalitzat (no vesicular) i almenys un dels criteris següents: – Adenopatia (suboccipital o retroauricular) – Artràlgies – Artritis
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents, d'acord amb els algoritmes diagnòstics: – Resposta específica d'anticossos de classe IgM* del virus de la rubèola en sèrum, excepte en dones embarassades, en què és imprescindible complementar amb altres tècniques diagnòstiques, com la determinació d'avidesa d'IgG (només una baixa avidesa confirmaria una primoinfecció) – Detecció de l'ARN del virus de la rubèola (RT-PCR) en una mostra clínica – Aïllament del virus de la rubèola en una mostra clínica – Elevació significativa del títol d'anticossos IgG específics o seroconversió entre els sèrums de la fase aguda i convalescent *Un resultat negatiu d'IgM en una mostra de sèrum recollida precoçment (en els primers 5 dies després de l'inici de l'exantema) per si sol no té validesa, ja que la resposta d'anticossos podria ser encara indetectable, per la qual cosa cal disposar d'altres resultats de laboratori per confirmar/descartar el cas.
Criteri epidemiològic	Contacte amb un cas confirmat, entre 12 i 23 dies abans de l'inici d'exantema

Classificació dels casos

Cas sospitós: persona que presenta el **criteri clínic**, però no s'ha estudiat adequadament per laboratori per confirmar-lo ni té vincle epidemiològic amb un cas confirmat per laboratori.

Cas probable: persona que no ha estat adequadament estudiada per laboratori, però presenta el **criteri clínic** i **l'epidemiològic**.

Cas confirmat: persona que presenta el **criteri clínic** i el de **laboratori** i que no ha estat vacunada recentment. Persona recentment vacunada en què s'identifica el genotip salvatge del virus.

Cas descartat: un cas sospitós que s'ha investigat i presenta qualsevol dels següents: resultats de laboratori negatius amb mostres adequadament recollides, vincle epidemiològic amb un cas confirmat per laboratori d'una altra malaltia exantemàtica, confirmació per laboratori d'una altra etiologia.

Definició de brot: Dos o més casos relacionats epidemiològica i/o virològicament.

Font: Protocolo de vigilancia de rubeola. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública