SALMONEL·LOSI

Definició de cas

Criteri clínic	Almenys una de les següents: – Febre – Diarrea – Dolor abdominal – Vòmits
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents: – Aïllament de Salmonella spp (distinta de S. Typhi i S. Paratyphi A, B o C) en una mostra clínica – Detecció de l'àcid nucleic de Salmonella spp (distinta de S. Typhi i S. Paratyphi A, B o C) en una mostra clínica
Criteri epidemiològic	Almenys una de les relacions epidemiològiques següents: – Transmissió de persona a persona – Transmissió d'animal a persona – Exposició a una font comuna – Exposició a aliments o aigua contaminats – Exposició mediambiental

Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: no procedeix.
- **Cas probable**: persona que presenta el **criteri clínic** i **l'epidemiològic**.
- **Cas confirmat**: persona que presenta el **criteri de laboratori**.

Definició de brot

L'aparició de 2 o més casos de salmonel·losi per Salmonella spp. diferent de S. Typhi i S. Paratyphi A, B o C amb relació epidemiològica.

Font: Protocolo de vigilancia de salmonelosis. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública