SÍFILIS

Definició de cas

Criteri clínic

Sífilis primària
- Almenys un xancre a zona genital, perianal o mucosa bucofaríngea o localització extragenital

Sífilis secundària

Almenys un dels següents:
- Exantema maculopapular difús
- Limfadenopatia generalitzada
- Condiloma pla
- Enantema
- Alopècia difusa

Sífilis latent precoç (menys d'un any)
- Absència de símptomes en el moment del diagnòstic i antecedents clínics compatibles amb sífilis primària o secundària els 12 mesos previs

Criteri de laboratori

Almenys, un dels quatre següents:
- Confirmació de *Treponema pallidum* en exsudats o teixits de la lesió mitjançant microscopia de camp fosc
- Confirmació de *Treponema pallidum* en exsudats o teixits de la lesió mitjançant tinció directa amb anticossos fluorescents
- Confirmació de *Treponema pallidum* en exsudats o teixits de la lesió mitjançant PCR
- Detecció d'anticossos de *Treponema pallidum* mitjançant cribratge (TPHA, TPPA o EIA, CLIA) **AMB**
  - Detecció addicional d'anticossos IgM anti *Treponema pallidum* (ELISA IgM, inmunoblot-IgM, 19S-IgM-FTA-abs) o
  - Anticossos no treponèmics

Criteri epidemiològic

Sífilis primària i secundària
- Un contacte sexual amb un cas confirmat

Sífilis latent precoç
- Un contacte sexual amb un cas confirmat en els 12 mesos previs al diagnòstic

Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: no procedeix.
- **Cas probable**: persona que presenta el criteris **clínic** i el criteri **epidemiològic**.
- **Cas confirmat**: persona que presenta els criteris de **laboratori**.

Definició de brot

L'aparició d'un nombre de 3 o més casos confirmats amb vincle epidemiològic entre ells.

Font: Protocolo de vigilancia de la sífilis. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública