SÍFILIS CONGÈNITA

Definició de cas

Criteri clínic	Persona menor de 2 anys amb, almenys, un dels següents: – Hepatosplenomegàlia – Lesions mucocutànies – Condiloma pla – Rinitis persistent – Icterícia – Pseudoparàlisi – Afectació sistema nirviós central – Anèmia – Síndrome nefròtic – Desnutrició – Limfadenopatia generalitzada
Criteri de laboratori	Cas probable. Almenys un dels tres següents: – VDRL positiu a LCR – Anàlisi serològiques de la mare (treponèmiques i no treponèmiques) positives – El nivel d'anticossos no treponèmics del nin quadruplica o més el del sèrum de la mare Cas confirmat. Almenys un dels següents: – Confirmació de *Treponema pallidum* mitjançant microscòpia de camp fosc en una mostra clínica – Confirmació de *Treponema pallidum* mitjançant tinció directa amb anticossos fluorescents (IFD) en una mostra clínica – Detecció de *Treponema pallidum* mitjançant àcid nucleic en una mostra clínica – Detecció de IgM específica de *Treponema pallidum* (FTA-abs, EIA) **AMB** ♦ una prova no treponèmica (VDRL, RPR) positiva en sèrum del nin
Criteri epidemiològic	Persona menor de dos anys amb proves positives (treponèmiques i no treponèmiques) de sífilis en la mare

Classificació dels casos

- **Cas sospitós**: no procedeix.
- **Cas probable**: persona menor de dos anys que presenta criteris clínics i, almenys, un dels següents: **criteri epidemiològic**, **criteri de laboratori de cas probable.**
- **Cas confirmat**: persona menor de dos anys que presenta els **criteris analítics de confirmació**.

Font: Protocolo de vigilancia de la sífilis congènita. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública