VARICEL·LA

Definició de cas

Criteri clínic	*Rash* o exantema màcul-pàpol-vesicular de començament sobtat, en absència d'una altra causa aparent
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents : – Detecció de l'ADN del VVZ mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR) – Aïllament del virus VVZ en cultius de línies cel·lulars – Detecció d'antigen viral per Immunofluorescència directa (IFD), utilitzant anticossos monoclonals específics – Seroconversió o increment significatiu d'anticossos IgG (d'almenys 3 vegades) entre dos sèrums presos en fase aguda i en fase convalescent
Criteri epidemiològic	Vincle epidemiològic amb un cas confirmat de varicel·la entre 10 i 21 dies abans de l'inici de rash o exantema

Classificació dels casos

Cas sospitós: persona que presenta el **criteri clínic**.

Cas probable: persona que presenta el **criteri clínic** i **l'epidemiològic**.

Cas confirmat: persona que presenta el **criteri clínic** i el de **laboratori**.

Definició de brot: Aparició de 3 o més casos de varicel·la, en un període de tres setmanes, en un mateix lloc.

Font: Protocolo de vigilancia de varicela. Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Trasmisibles. Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública